学ぶ / 眼科

眼底検査・OCT・散瞳

検査の目的と生活への影響

このノートについて

成人眼科外来で学ぶ看護学生・看護師へ。眼底診察と写真は眼底の表面を、OCTは走査した部位の断面を捉えます。散瞳が必要になる条件と、点眼後のまぶしさや近くの見えにくさを踏まえた移動・帰宅の支援を、検査の比較と学習事例で整理します。

Nurse Atlas 編集部



成人眼科外来の事例を示す流れ図。点眼前に運転予定を聞き、スタッフと帰宅手段を調整し、帰宅前に本人に説明してもらいます。

このノートで学ぶ 7項目

01 眼底診察と眼底写真は、表面のどこをどう捉える？
02 OCTでは、どの場所の断面を見ている？
03 眼底診察・写真とOCTを組み合わせると、何を確かめられる？
04 散瞳はいつ必要？　OCTでも点眼することはある？

ほか3項目を収録

記事更新 2026年11月22日　発行 2026年11月23日


はじめに

成人の眼科外来で看護学生や看護師が患者さんに説明するとき、眼底検査とOCTでは何が見え、なぜ散瞳するのでしょうか。眼底診察と眼底写真は見える範囲の表面を捉え、OCTは光で走査した部位の断面を示し、散瞳は瞳孔を広げて眼内の観察条件を変えます。同じ受診で複数の検査をしても、確認する場所や、結果から分かることはそれぞれ異なります。この記事では、視力や視野などの見え方と画像所見の違いを整理し、検査後のまぶしさや文字の読みづらさが移動にどう影響するかを考えます。帰りに自分で運転する予定の患者さんを例に、点眼前に聞くことと、帰宅前に本人の言葉で確かめることを学びます。

NOTES

要点・疑問・次に調べること

01　眼底診察と眼底写真は、表面のどこをどう捉える？



同じ右眼を同じ向きと大きさで比較した模式図。眼底写真は枠内に写った部分を記録します。

眼底診察では医師が眼の奥を観察し、必要に応じて見る部位を変えます。眼底写真は撮影時に写った範囲の所見を記録する画像で、写る範囲や判読のしやすさは装置、撮影位置、眼の状態で変わります。 Ultra-wide-field fundus photography compared to ophthalmoscopy in diagnosing and classifying major retinal diseases Diabetic eye screening: guidance on fundus image quality and when adequate images cannot be taken


眼底では、眼の奥に広がる網膜、中心付近の黄斑、視神経が眼球につながる視神経乳頭、網膜の血管などを見ます。医師は症状や診察の目的に応じて、黄斑などの中心部や網膜の周辺部を観察します。広い範囲を撮る装置でも、周辺の端まで十分に見えるとは限りません。超広角写真と眼底診察を比べた研究でも、散瞳して複数方向の画像を合成した条件で、一部の最周辺病変は十分に描出されませんでした。 Get a Dilated Eye Exam Ultra-wide-field fundus photography compared to ophthalmoscopy in diagnosing and classifying major retinal diseases Age-related macular degeneration

例えば、イングランドの糖尿病眼スクリーニングでは、写真を判読して糖尿病による網膜の変化を探します。通常のデジタル撮影では黄斑の中心と視神経乳頭を中心にした画像を用い、位置と画質も判定します。「糖尿病による変化なし」という結果が示すのは、その検査で判定できた範囲と目的についてです。撮影範囲外の網膜や、視力・視野などの視機能まで正常と判断することはできません。本人に見え方の変化があれば、写真の結果と併せて眼科に伝えます。 Your guide to diabetic eye screening Diabetic eye screening: guidance on fundus image quality and when adequate images cannot be taken はたらく人の目を守る眼科検診ハンドブック Q&A Get a Dilated Eye Exam

NOTES

要点・疑問・次に調べること

02　OCTでは、どの場所の断面を見ている？



右眼の眼底像の黄斑を通る走査線と、その区間のOCT断層の対応を示す模式図です。両方とも左端がA、右端がBです。

後眼部のOCT（光干渉断層撮影）は、光を使って、走査した部位の深さ方向の構造を断面にします。黄斑を通る断面を読むときは、どちらの眼か、どの位置をどの向きに走査した像かを先に確認します。 Optical Coherence Tomography Ultra-Widefield Swept-Source Optical Coherence Tomography Findings of Peripheral Retinal Degenerations and Breaks


眼の組織から戻る光を装置内の基準となる光と重ね、深さごとの信号を取り出します。横方向の複数の位置で得た信号を並べると、網膜の層や厚みなどを断面として見られます。Huangらが1991年に原理を示した網膜の図は摘出標本のもので、現在の外来では生体の眼を撮影します。 Optical Coherence Tomography Ultra-Widefield Swept-Source Optical Coherence Tomography Findings of Peripheral Retinal Degenerations and Breaks

同じ右眼の眼底像に黄斑を通る線を引き、その線上の断面を横に並べると、断面のどの位置が眼底のどこに当たるかをたどれます。1本の断面も、複数の断面から作った画像も、示すのは実際に走査した領域です。周辺の病変を狙える広域装置でも、黄斑の断面だけで周辺網膜全体を評価することはできません。文字がどれだけ読めるか、視線を向けたままどこまで見えるかは、視力検査や視野検査などで別に確かめます。 Ultra-Widefield Swept-Source Optical Coherence Tomography Findings of Peripheral Retinal Degenerations and Breaks Get a Dilated Eye Exam

NOTES

要点・疑問・次に調べること

03　眼底診察・写真とOCTを組み合わせると、何を確かめられる？



眼底の表面、OCTで走査した断面、本人が話す見え方を診察で照らし合わせる模式図です。

眼底診察や写真で眼底の所見を捉え、OCTで関心のある部位の断面を調べると、同じ眼を異なる情報から評価できます。組み合わせは、疑う病気、診断時か経過観察か、本人が感じる見え方の変化によって変わります。 Age-related macular degeneration Diabetic retinopathy: management and monitoring

英国NICEの成人の加齢黄斑変性ガイドライン（NG82）は、見え方が変化した人の評価に眼底診察を用い、活動性のある晩期の滲出型が疑われる人にはOCTを勧めています。その病型を経過観察中、OCT像に変化がなくても視力や視機能が低下した場合には、眼底診察またはカラー眼底写真を追加するよう勧めています。例えば「文字の列がゆがむ」という訴えを聞いたら、いつから、どちらの眼で、何を見ると気づくかを確かめ、経過とともに眼科スタッフへ伝えます。 Age-related macular degeneration

糖尿病では、写真で網膜の血管に関わる変化を探すスクリーニングと、病院眼科での精密な評価で目的が変わります。NICEの病院眼科向けガイドライン（NG242）では、増殖糖尿病網膜症の評価に診察と超広角眼底画像の併用を検討し、糖尿病黄斑浮腫を評価するときにはOCTを使うよう勧めています。黄斑浮腫は網膜の中心付近がむくんだ状態です。どちらも糖尿病に関わる検査ですが、血管の変化を探す問いと、黄斑のむくみを確かめる問いで、必要な画像が変わります。 Your guide to diabetic eye screening Diabetic retinopathy: management and monitoring

NOTES

要点・疑問・次に調べること

03　眼底診察・写真とOCTを組み合わせると、何を確かめられる？（続き）

項目	得られる情報	結果や予定を聞くときの確認
眼底診察	医師が網膜・血管などを観察し、症状や目的に応じて部位を確かめる。Ultra-wide-field fundus photography compared to ophthalmoscopy in diagnosing and classifying major retinal diseases Age-related macular degeneration	どの範囲を診たか。周辺部までの観察や追加検査が必要と説明されたか。Ultra-wide-field fundus photography compared to ophthalmoscopy in diagnosing and classifying major retinal diseases
眼底写真	撮影範囲の表面所見を記録する。範囲と画質が判読に影響する。Diabetic eye screening: guidance on fundus image quality and when adequate images cannot be taken	どちらの眼のどの部位を撮ったか。どこまで判読できたか。撮り直しや別の評価の予定があるか。Diabetic eye screening: guidance on fundus image quality and when adequate images cannot be taken Your guide to diabetic eye screening
OCT	走査した位置の断層像から、網膜の層や厚みなどを捉える。Optical Coherence Tomography Ultra-Widefield Swept-Source Optical Coherence Tomography Findings of Peripheral Retinal Degenerations and Breaks	どちらの眼のどこを走査したか。症状や視力の変化と照らし合わせ、次に何を確認する予定か。Ultra-Widefield Swept-Source Optical Coherence Tomography Findings of Peripheral Retinal Degenerations and Breaks Age-related macular degeneration
薬剤による散瞳	瞳孔を広げ、眼の奥を観察しやすくする。薬によってはピントの調節にも影響する。Get a Dilated Eye Exam ミドリンP点眼液	今日の検査で散瞳する予定か。帰宅時の移動、運転・機械操作、帰宅後の相談先についてどう説明されたか。ミドリンP点眼液 診療のご案内 重篤副作用疾患別対応マニュアル 緑内障


表の注記。位置や画質の確認は、画像からどこまで判断できたかを知るために行います。画像の変化が小さくても、視力や視野の検査結果、本人が生活で感じた変化にはそれぞれ意味があります。数値や画像だけで正常・異常を自己判断せず、今回の所見が何を示し、何を追加で確認するのかを眼科の説明で確かめます。

Diabetic eye screening: guidance on fundus image quality and when adequate images cannot be taken はたらく人の目を守る眼科検診ハンドブック Q&A Get a Dilated Eye Exam Age-related macular degeneration

NOTES

要点・疑問・次に調べること

04　散瞳はいつ必要？　OCTでも点眼することはある？



同じ眼を正面から見た散瞳前と散瞳後の模式図。虹彩の外径は同じで、散瞳後は中央の黒い開口である瞳孔が大きくなります。

薬剤による散瞳は、瞳孔を広げて眼底を観察しやすくするために行います。OCTには散瞳せず撮れる場合もあり、必要性は、瞳孔の大きさや眼の状態、何をどこまで調べるか、使用する装置と施設の運用で異なります。 Get a Dilated Eye Exam Evaluating the effect of pupil dilation on spectral-domain optical coherence tomography measurements and their quality score 診療のご案内

瞳孔は外から眼の奥を観察する光が通る開口部です。開口が広がると、眼の奥を見渡しやすくなります。散瞳前後でOCTを比較した研究では、特定の装置で緑内障のある人と健康な人を撮影し、測った構造の値や画質指標に統計学的に有意な差を認めませんでした。この研究は、瞳孔が小さい人や測定に影響する眼の混濁がある人などを除外しています。同じ日に散瞳する予定でも、OCTのためか、併せて行う眼底診察や写真のためかをスタッフに確認すると、患者さんに目的を説明しやすくなります。 Get a Dilated Eye Exam Evaluating the effect of pupil dilation on spectral-domain optical coherence tomography measurements and their quality score 診療のご案内

看護で確認：散瞳の予定があるときは、以前に点眼で具合が悪くなった経験や、散瞳に関して他院から受けた注意があるかを聞き、検査前に担当者へ共有します。患者さんに説明するときは、今日どの検査のために行うかと、帰宅方法を一緒に確かめます。 ミドリンP点眼液 Dilating drops 診療のご案内

NOTES

要点・疑問・次に調べること

05　散瞳後にまぶしい、近くが見えにくいとき、帰宅までに何を確認する？



明るい病院の出口と手元のスマートフォンを例に、散瞳後のまぶしさと近くの見づらさで生じる困りごとを示します。

薬剤散瞳後は、一時的にまぶしさや近くの見づらさが生じることがあります。点眼前に帰宅手段を聞き、検査後には普段との差と、帰り道でどんな場面に困りそうかを確かめます。 Get a Dilated Eye Exam ミドリンP点眼液 Dilating drops

瞳孔が広い間は強い光が入りやすくなります。近くにピントを合わせる働きが薬で弱まると、スマートフォンや案内用紙の文字もぼやけます。病院の出口の明るさがつらい、階段や縁石の端が分かりにくい、乗り場の案内が読みにくいなど、困りごとは場面で変わります。普段から眼鏡や付き添いが必要か、今はどこが見づらいかを聞き、必要なら明るい場所を避けた待機場所や段差の少ない動線を案内します。紙の案内が読みづらいときは、待ち合わせ場所や帰宅後の連絡先を口頭でも伝えます。 ミドリンP点眼液 Dilating drops Get a Dilated Eye Exam

注意点：日本のミドリンP点眼液の電子添文8.1は、散瞳や調節麻痺による症状が回復するまで、自動車などの運転や機械類の操作を避けるよう求めています。強い光を直接見ないためのサングラスなどの説明も同じ箇所にあります。実際の指導は、使用した薬剤の電子添文と検査施設の指示を確かめます。例えば国立国際医療センターの眼科は、散瞳による見えづらさを踏まえ、自分で車を運転せず来院するよう案内しています。 ミドリンP点眼液 診療のご案内

眼の健康な若年の運転者を対象とした研究では、トロピカミドで散瞳するとまぶしさへの感度が増し、日中の閉鎖コースで背景と明るさの差が小さい障害物の認識・回避が難しくなりました。見え方の変化は薬や患者さんの条件によって異なります。帰宅の説明では、経過時間だけで運転できると判断せず、当日の施設の説明を確認し、必要に応じて送迎や同伴で帰れる手段を具体化します。 Pupil dilatation does affect some aspects of daytime driving performance Dilating drops ミドリンP点眼液 Get a Dilated Eye Exam

散瞳後に強い眼痛や急な見え方の悪化などがあれば、薬による一時的なぼけかを本人に判断させず、院内ではすぐに眼科スタッフへ伝えます。帰宅後は、受け取った案内に沿って速やかに眼科または時間外の連絡先へ相談します。 重篤副作用疾患別対応マニュアル 緑内障

NOTES

要点・疑問・次に調べること

06　「車で来ました」と聞いたとき、点眼前と帰宅前にどうつなぐ？



成人眼科外来の事例を示す流れ図。点眼前に運転予定を聞き、スタッフと帰宅手段を調整し、帰宅前に本人に説明してもらいます。

帰りに自分で運転する予定が分かったら、点眼前に帰宅手段を具体化できるよう、散瞳の予定を担当スタッフと確認します。帰宅前には、実際に誰とどの手段で帰るか、当日の運転・機械操作の注意や困ったときの連絡先を、本人の言葉で説明してもらいます。 ミドリンP点眼液 診療のご案内 Use the Teach-Back Method: Tool 5

架空の学習例です。成人のAさんは「車で来ました。検査が終わったら、自分で運転して帰るつもりです」と話しました。看護師は、車はどこにあるか、迎えを頼める人がいるか、帰宅後に運転や機械を使う仕事の予定があるかを聞きます。点眼前に担当医・検査スタッフへ「ご本人が運転して来院し、帰りも運転予定です。迎えが可能か確認しています」と伝え、当日の検査と説明をそろえます。 ミドリンP点眼液 診療のご案内


この例では、家族が迎えに来られると分かり、Aさんは自分で運転せず帰ることになりました。検査後に「外に出るとまぶしい。スマホで連絡先が読みづらい」と話すAさんに、家族が来るまでの待機場所と、階段を避けられる待ち合わせ経路を一緒に確かめます。点眼前にはなかった見づらさと普段の移動での困難を聞き分け、必要な案内を担当スタッフと共有します。 Dilating drops Get a Dilated Eye Exam

看護で確認：「説明が伝わったか確かめたいので、今日は誰とどこで待ち合わせて、どうやって帰るか教えてください。運転や機械の操作についてはどうしますか。帰宅後に強い目の痛みが出たら、どこに連絡しますか」と聞きます。「家族が迎えに来るので、玄関近くで待ちます。自分の車は運転しません。点眼の影響がある間は機械の操作もしません。家で急に目が痛くなったら、案内された眼科に連絡します」のように、行動まで言葉にできるかを確かめます。説明が伝わりにくかったところは言い換え、もう一度本人の言葉で確認します。 ミドリンP点眼液 重篤副作用疾患別対応マニュアル 緑内障 Use the Teach-Back Method: Tool 5

NOTES

要点・疑問・次に調べること

07　確認問題　黄斑のOCTと、散瞳後の帰宅説明を言葉にできる？



学習問題の二場面を示す模式図。左は黄斑の限られた範囲を走査したOCT、右は散瞳後に家族の迎えを待つ患者さんです。

成人外来の短い問いで、検査で見た位置と帰宅時の行動を確認します。画像は撮影した眼と部位を、帰宅時の説明は実際に使った薬剤と施設からの案内を前提に考えます。Ultra-Widefield Swept-Source Optical Coherence Tomography Findings of Peripheral Retinal Degenerations and Breaks ミドリンP点眼液

問い1　「黄斑のOCTで目立つ変化はありません」と聞いた患者さんに、「それなら視野も網膜の周りも大丈夫ですね」と尋ねられました。何を説明しますか。

答えの例。「今日のOCTでは、網膜の中心付近で走査した場所の断面を見ています。周辺の網膜を調べる診察や、どこまで見えるかを測る視野検査には、それぞれの役割があります。気になる見え方があれば、その内容を眼科の診察で一緒に確かめましょう」。Ultra-Widefield Swept-Source Optical Coherence Tomography Findings of Peripheral Retinal Degenerations and Breaks Get a Dilated Eye Exam Age-related macular degeneration

問い2　散瞳を受けた患者さんが「家族に迎えを頼めそうです」と話しました。帰宅前にどんなことを本人の言葉で確認しますか。

答えの例。誰が迎えに来るか、どこで待つか、そこまで階段や案内表示で困らないかを聞き、移動に必要な支援を確かめます。運転と機械操作に関する当日の指示、困ったときの連絡先も、本人の言葉で説明してもらいます。Dilating drops ミドリンP点眼液 Use the Teach-Back Method: Tool 5

NOTES

要点・疑問・次に調べること

参考にした資料

1. National Eye Institute · Get a Dilated Eye Exam · 2025
   https://www.nei.nih.gov/eye-health-information/healthy-vision/finding-eye-doctor/get-dilated-eye-exam

   2025年11月26日更新。What happens during a dilated eye exam?、How does dilation work?、What happens after a dilated eye exam?。米国の一般向け案内。視力・視野と眼内観察の区別、散瞳の目的と帰宅時の付き添いを見出し1〜7に使用。

2. Nature Publishing Group · Ultra-wide-field fundus photography compared to ophthalmoscopy in diagnosing and classifying major retinal diseases · 2022
   https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9650656/

   Scientific Reports掲載のMidenaらの原著。Methods・Results・Discussionを確認。網膜診療の新患で散瞳下CLARUS 500の合成画像と診察を比較。画質不良・高度な中間透光体混濁の除外があり、最周辺病変には写真で見えにくい例があった。見出し1・3。

3. NHS England · Diabetic eye screening: guidance on fundus image quality and when adequate images cannot be taken · 2026
   https://www.gov.uk/government/publications/diabetic-eye-screening-pathway-for-images-and-where-images-cannot-be-taken/diabetic-eye-screening-guidance-when-adequate-images-cannot-be-taken

   2026年3月11日更新。イングランドのNHS Diabetic Eye Screening Programmeのスタッフ向け資料。2.1、2.3、3、4節で撮影視野、位置、判読可能性、画像不十分時の対応を確認。見出し1・3の写真の範囲・画質と表の注記。

4. NHS England · Your guide to diabetic eye screening · 2025
   https://www.gov.uk/government/publications/diabetic-eye-screening-description-in-brief/your-guide-to-diabetic-eye-screening

   2025年8月29日更新。イングランドの糖尿病眼スクリーニングの参加者向け案内。Why the NHS offers diabetic eye screening、How we do diabetic eye screening、Diabetic eye screening results。写真判定の対象と通常の眼科評価との違いを見出し1・3に使用。

5. 公益社団法人 日本眼科医会 · はたらく人の目を守る眼科検診ハンドブック Q&A · 2026
   https://www.gankaikai.or.jp/info/kenshinhandbook2026v2.pdf

   奥付2026年5月10日。産業保健従事者向け。第1章Q3・Q4（冊子pp.3–4）、第3章Q1（p.6）、第5章Q2（p.11）。職域の健診所見と視機能の区別、健診後の精密評価の例を見出し1・3に使用。

6. American Association for the Advancement of Science · Optical Coherence Tomography · 1991
   https://web.mit.edu/2.717/www/oct_fujimoto_91.pdf

   Science掲載のHuangらの原著（MIT公開の掲載版PDF）。Abstract、原理の説明、Fig. 1・2を確認。深さごとの光の信号を横方向に並べる断層像の原理。ヒト網膜の図は摘出標本。見出し2・3。

7. Dove Medical Press Limited · Ultra-Widefield Swept-Source Optical Coherence Tomography Findings of Peripheral Retinal Degenerations and Breaks · 2021
   https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8699765/

   Clinical Ophthalmology掲載のKurobeらの原著。MethodsのStudy Design and Setting・Instrumentation、ResultsのPatientsと図。選択された周辺網膜病変で広域装置から狙った位置の断層像を得た後ろ向き研究。位置対応と範囲の例に使用。見出し2・3・7。

8. National Institute for Health and Care Excellence · Age-related macular degeneration · 2018
   https://www.nice.org.uk/guidance/ng82/resources/agerelated-macular-degeneration-pdf-1837691334853

   NG82。表紙の発行日は2018年1月23日。成人の加齢黄斑変性が対象。Overview、1.4.1–1.4.4・1.4.7–1.4.9（pp.10–11）、1.7.8–1.7.9（p.18）を確認。病型・診療場面で眼底診察・写真とOCTを補い合わせる例。見出し1・3・7。

NOTES

要点・疑問・次に調べること

参考にした資料（続き）

9. National Institute for Health and Care Excellence · Diabetic retinopathy: management and monitoring · 2024
https://www.nice.org.uk/guidance/ng242/resources/diabetic-retinopathy-management-and-monitoring-pdf-66143953240261

   NG242。表紙の発行日は2024年8月13日。Overview、1.5.10（p.14）、1.6.11（p.21）。病院眼科での評価における増殖糖尿病網膜症と糖尿病黄斑浮腫の画像の使い分け。定期スクリーニングは対象外。見出し3。

10. BioMed Central · Evaluating the effect of pupil dilation on spectral-domain optical coherence tomography measurements and their quality score · 2015
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4676126/

    BMC Ophthalmology掲載のTangaらの原著。Methods・Results・Discussionを確認。緑内障群と健康対照で特定のSD-OCTによる構造計測を散瞳前後で比較。小瞳孔や測定に影響する眼の混濁などを除外。無散瞳で撮影した具体例。見出し4。

11. 国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター · 診療のご案内
https://www.hosp.jihs.go.jp/s033/010/index.html

    眼科の外来診療のご案内、眼科精密検査。散瞳して行う眼底検査と来院時の運転回避、疾患に応じた検査の同院の案内。ページの発行年は確認できず空欄。見出し4・5・6。

12. 参天製薬株式会社 · ミドリンP点眼液 · 2022
https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuDetail/300237_1319810Q1053_1_13

    PMDAの品目情報から開いた2022年2月改訂第1版の電子添文。2.1・2.2、4、8.1、18.1を使用。製剤固有の禁忌、調節への作用、散瞳・調節麻痺の症状が回復するまでの運転・機械操作と強い光の注意。見出し3–7。

13. University Hospitals Plymouth NHS Trust · Dilating drops · 2025
https://www.plymouthhospitals.nhs.uk/display-pil/pil-dilating-drops-6823

    眼科患者向け資料v2、2025年9月発行。Can anyone safely have these drops?、Will the eye drops affect my sight?、How long will the effects last?。まぶしさ、ピントのぼけ、段差への注意、薬による違いを見出し4〜7に使用。英国施設の運転条件や時間は日本の説明へ転用していない。

14. BMJ Publishing Group · Pupil dilatation does affect some aspects of daytime driving performance · 2003
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1771881/

    British Journal of Ophthalmology掲載のWoodらの原著。METHODS・RESULTS・DISCUSSIONを確認。眼の健康な若年免許保有者16人がトロピカミド散瞳前後の条件で日中の閉鎖コース等を評価。まぶしさへの感度と低コントラスト障害物の認識・回避の変化。見出し5。運転再開時刻の資料ではない。

15. 厚生労働省 · 重篤副作用疾患別対応マニュアル 緑内障 · 2026
https://www.mhlw.go.jp/topics/2006/11/dl/tp1122-1o05_r08.pdf

    令和8年2月改定。A 患者の皆様へ（冊子pp.5–6）、B 医療関係者の皆様へ 1の1）（4）・2の1）（1）。薬剤性の急激な眼痛・かすみ等の連絡と、散瞳薬が関与し得る条件。見出し5・6。頻度や家庭での鑑別には使用していない。

16. Agency for Healthcare Research and Quality · Use the Teach-Back Method: Tool 5 · 2024
https://www.ahrq.gov/health-literacy/improve/precautions/tool5.html

    2024年4月レビュー。Actionの非誘導的な確認、本人の言葉による説明、伝わらなかったときの言い換え・再確認。プライマリケア向け手法を眼科外来の架空事例へ応用。見出し6・7。

Nurse Atlas · ナースアトラス
記事の最新版を確認する
発行番号：premium-sample-20261122-eye-exams

NOTES

要点・疑問・次に調べること